

مدد جوی گرامی سلام:

یکی از اقدامات درمانی که در برنامه مراقبتی شما منظور شده است برونکوسکوپی است.

این آزمون امکان معاینه مجاری تنفسی (حنجره، تراشه، برونش) را توسط یک وسیله کوچک و باریک به نام برونکوسکوپ فراهم می سازد.



پزشک می تواند هر گونه تنگی و یا اختلالی را در مجرای تنفسی توسط دوربینی که به انتهای برونکوسکوپ نصب شده است، مشاهده نماید.

همچنین توسط این وسیله پزشک می تواند از بافت مجرای تنفسی نمونه برداری کند. (به تشخیص مشکل شما کمک خواهد کرد) و یا اجسام خارجی و یا ترشحات موجود در مجرای تنفسی را خارج سازد.

مراقبت های لازم قبل از آزمون:

• از ۸ ساعت قبل از آزمون از خوردن و نوشیدن اجتناب کنید.



• از ۲۴ ساعت قبل از آزمون از خوردن نوشیدنی های حاوی الکل اجتناب کنید.

• دندان های مصنوعی، لنز های تماسی و هرگونه زیور آلات خود را خارج کنید.


• داروهای تجویز شده را طبق نظر پزشک خود مصرف کنید.

• چنانچه داروهای فشار خون، دیابت، تشنج، آسپرین، وارفارین و داروهای قلبی استفاده می کنید حتماً به پزشک خود اطلاع دهید.

• بلافاصله قبل از آزمون برای بی حسی گلو از بی حس کننده استفاده می شود. این کار به حرکت آسانتر برونکوسکوپ به داخل تراشه کمک می کند.

ممکن است قبل از آزمون برای شما آرامبخش استفاده شود. دریافت آرامبخش به حفظ آرامش شما حین جا گذاری برونکوسکوپ کمک خواهد کرد.

حین انجام آزمون:



این آزمون ۳۰ الی ۶۰ دقیقه به طول می انجامد. شما به وضعیت به پشت یا نیمه نشسته قرار خواهید گرفت.

بعد از تاثیر دارو های بی حسی، برونکوسکوپ از طریق بینی و یا دهان به داخل مجرای تنفسی هدایت خواهد شد. توام با جلو راندن برونکوسکوپ در صورت نیاز مقدار کمی داروی بی حس کننده به منظور کاهش سرفه و خس خس کردن از طریق لوله جانبی برونکوسکوپ به داخل مجرای تنفسی اسپری یا تزریق می شود.

توسط برونکوسکوپ از مجاری تنفسی بزرگ (برونش ها) عکس برداری خواهد شد.

شما ممکن است در حین برونکوسکوپی دچار ناراحتی شوید. فراموش نکنید که باید آرامش خود را حفظ کنید.



سازمان تاسن ارجانی

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید دکتر لبافی نژاد

برونکوسکوپی



نشریه شماره ۵۸

شماره تماس: ۲۳۶۰۱

- در صورت نیاز بلافاصله بعد از آزمون از قفسه سینه شما ۱ عکس گرفته خواهد شد.
- به مدت ۶ الی ۸ ساعت بعد از برونکوسکوپی از استعمال دخانیات پرهیز کنید.
(استعمال دخانیات ممکن است سبب تحریک سرفه و خونریزی شود.)



- در صورت بروز سرفه با دفع ترشحات خونی بیش از حد، مشکل در نفس کشیدن، خس خس و درد قفسه سینه فوراً به پزشک مراجعه نمایید.
با آروزی سلامت

توجه داشته باشید زمانیکه برونکوسکوپ از طریق دهان وارد می شود شما باید دم و بازدم را از طریق بینی و با دهان باز انجام دهید.

در خاتمه هنگامیکه پزشک معاینه دستگاه تنفسی را اتمام می رساند برونکوسکوپ را خارج می نماید.

مراقبت های لازم بعد از آزمون:

- برای اینکه احساس راحتی کنید زیر سر شما بالا آورده می شود.
- تا ۲ ساعت بعد از انجام برونکوسکوپی تحت نظر قرار خواهید گرفت.
- تا زمانیکه اثر بی حسی از بین نرفته است و پزشک به شما اجازه نداده است از خوردن و آشامیدن و یا مصرف داروهای خوارکی اجتناب کنید.
- گاهی ممکن است به صورت وقت دچار گرفتگی صدا یا گلو درد شوید. این عارضه به صورت موقت بوده و کم کم برطرف می شود.

