

گذاشتن کاتتر ورید مرکزی جهت همودیالیز چیست؟

قراردان یک لوله پلاستیکی نرم (با قطر نصف خودکار و طول حدود ۲۰ سانتیمتر) از طریق پوست در یک رگ مرکزی در ناحیه گردن یا کشاله ران است که می توان از طریق آن خون راجهت دیالیز وارد دستگاه همودیالیز کرد و پس از دیالیز به بدن برگرداند.

چرا و در چه شرایطی کاتتر گذاری ضرورت پیدا می کند؟

در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه که فیستول شریانی- وریدی به موقع تعیبه نشده است و یا در بیماران مبتلا به نارسایی حاد که به علت عملکرد ناکافی کلیه امکان برداشتن سموم و مایعات اضافی توسط کلیه وجود ندارد، نیاز به کاتتر گذاری جهت همودیالیز وجود دارد.

آمادگیهای قبل از کاتتر گذاری چیست؟

بیمار عزیز در صورتیکه از داروهای رقیق کننده خون نظیر آسپیرین، پلاویکس و وارفارین استفاده می کنید به پزشک اطلاع دهید.

قبل از انجام کاتتر گذاری بهتر است استحمام نمائید.

موهای ناحیه تعیبه کاتتر با ژیلت تراشیده شود.

نمونه ای از شما گرفته می شود که اختلالات خونریزی دهنده را در بدن شما بررسی می کند.

پزشک دلایل انجام کاتتر گذاری و راههای جایگزین و عواقب عدم انجام آن را به شما شرح می دهد.

نحوه قرار دادن کاتتر همودیالیز چگونه است؟

کاتتر گذاری در اتاقی خارج از بخش که به همین منظور تجهیز شده است، انجام می شود.

شما به پشت روی تخت دراز می کشید و سر تخت پائین آورده می شود. (پائین تر از پای بیمار قرار می گیرد)

در صورتی که قرار است کاتتر در ناحیه کشاله ران گذاشته شود نیازی به پائین آوردن سر تخت نیست.

بعد از ضد عفونی کردن پوست، محل ورود کاتتر بی حس می شود. پس از گرفتن رگ با سوزن و قراردادن کاتتر، کاتتر با بخیه در محل ثابت می شود.

بعد از انجام این کار از شما عکس قفسه سینه گرفته می شود.

مراقبتهای بعد از کاتتر گذاری چیست ؟

از تماس آب با کاتتر خوداری شود. جهت استحمام باید کاتتر با پوشش ضد آب پوشانده شود . بهتر است که سر و بدن جداگانه شسته شوند تا احتمال تماس کاتتر با آب کم شود .

از فعالیتهای سنگین و فعالیتهایی که منجر به افزایش فشار داخل شکمی می شوند، مثل زور زدن پرهیز شود.


در صورت وقوع درد، خونریزی در اطراف کاتتر، تب و یا لرز حین دیالیز سریعاً به مرکز درمانی مراجعه شود.



سازمان تامين اجتماعي

بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد

شالردون چيست؟



نشريه شماره ۴۸

شماره تماس: ۲۳۶۰۱

چه عوارضي پس از تعبيه کاتتر اتفاق مي افتد؟

عوارض کاتتر گذاري نادر است و عبارتند از خونريزي ، آسيب به بافتهاي اطراف از جمله شريان مجاور، آسيب به ريه .

در صورت وقوع خونريزي و آسيب عروقي اکثرا موارد با استراحت و تمهيدات غيرتهاجمي کنترل مي شود . به ندرت نياز به تزريق خون و جراحي جهت کنترل خونريزي است.

به ندرت آسيب به بافت ريه وارد مي شود.

عوارض دير رس کاتتر شامل عفونت ،ايجاد لخته و تنگي در رگ و تنگي کاتتر است .