



سازمان تامين اجتماعي

بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد

تب با علت ناشناخته (FUO) Fever of unknown origin

نشریه شماره ۴۲

شماره تماس: ۲۳۶۰۱

۲

بدخیمی هایی که منجر به FUO میشوند:

- بیماری هوچکین
- لنفوم
- لوسمی
- سرطان کولون
- هیپاتوم

تست ناپروکسن:

برای افتراق FUO بکار می رود. بدین ترتیب که دو دوز ناپروکسن ۲۵۰ mg به صورت دو بار در روز به بیمار داده میشود. اگر تب بعد از دادن ناپروکسن کاهش یابد به نقص ایمنی و یا وجود بد خیمی شک میشود، ولی اگر تب کاهش یافته و مجددا افزایش یابد به نفع عفونت است.

۱

تب با منشا ناشناخته شامل خصوصیات زیر است:

- دمای بیشتر از ۳۸.۳ درجه سانتی گراد در چند نوبت
- مدت تب بیشتر از ۳ هفته
- عدم تشخیص علی رغم یک هفته بستری در بیمارستان

علل

- عفونتهای پنهان بیمارستانی
- عفونت IV Line
- آمبولی ریه
- تب دارویی
- عفونتهای ویروسی وابسته به انتقال خون

علل کلاسیک FUO

- عفونتها بخصوص سل خارج ریوی، منونوکلئوز عفونی، عفونت HIV، آبسه های داخل شکمی، کلیوی، آندوکاردیت، آبسه دندان و مالاریا که سل شایع ترین علت تب ناشناخته در افراد مسن می باشد.

تشخیص

شرح حال، کشت خون، سونوگرافی، CT اسکن، گرافی سینوسها، داروهای مشکوک به ایجاد تب، CBC، PPD، ESR.