

Upjo - Uvjo

یکی از نا هنجاری های سیستم اداری ، انسداد حالب در محل اتصال به لگنچه (UPJO) و یا انسداد حالب در محل اتصال به مثانه (UVJO) است که بیشتر در پسر ها دیده می شود.

علت ناهنجاری :

بیماری انتقال ژنتیکی مشخصی ندارد ولی ممکن است در چندین عضو یک خانواده دیده شود ولی علت دقیق انسداد اغلب نا مشخص است .

علائم بالینی :

* وجود خون در ادرار

* درد پهلو و استفراغ در کودکان

* عفونت ادرار (سوزش ادرار، تب ، قطره قطره ادرار کردن) و در بعضی از کودکان افزایش فشار خون لازم به ذکر است که گاهی این نا هنجاری بدون علامت است .

تشخیص :

بیماری با سونوگرافی از کلیه ، مثانه و حالب و عکسبرداری از کلیه، مثانه و حالب قابل تشخیص است .

درمان:

تنها راه درمان عمل جراحی است .

امروزه با توجه به کم عارضه بودن جراحی به روش بسته (جراحی لاپاراسکوپی) توصیه می شود .

مراقبت از بیماران قبل از عمل جراحی :

* از دو روز قبل از جراحی لاپاراسکوپی ، لبنیات و غذاهای تولید کننده نفخ و گاز مصرف نکنند تا میزان اتساع روده ها کمتر شود .

* یک روز قبل از عمل مایعات صاف شده مصرف کنند.
* از قرص بیزاکودیل و یا شیاف بیزاکودیل استفاده کنند و در صورت توصیه پزشک تنقیه شب قبل از عمل انجام شود .

* از ساعت ۱۲ نیمه شب مصرف هر گونه مایعات و غذا برای بیماران ممنوع است و باید ناشتا بمانند.

مراقبت پس از عمل جراحی :

* روز اول پس از عمل جراحی رژیم مایعات شروع می شود .

* روز دوم پس از عمل در صورت عدم وجود مشکل گوارشی رژیم معمولی شروع می شود .

* بیمار غالباً پس از عمل سند مجرا و درن دارد، سوند، روز دوم پس از عمل و درن هنگام ترخیص خارج می شود.

* از داخل مثانه تا حالب یک سند داخلی به نام DJ برای بیمار گذاشته می شود که ۴۰-۳۰ روز پس از عمل با تعیین وقت قبلی توسط پزشک در اتاق عمل خارج می شود .

نکات قابل توجه در این بیماران :

۱ - در صورتی که پس از خروج سند مجرا ، ترشحات درن افزایش یابد سند مجرا به مدت ۷-۵ روز دیگر در محل باقی می ماند .

۲ - در صورتی که پس از ترخیص بیمار قطره قطره ادرار کند و توان نگه داشتن ادرار خود را نداشته باشد و یا توان نگه داشتن ادرار خود را نداشته باشد احتمال جا به جا شدن سند داخلی DJ وجود دارد که بلافاصله باید به پزشک مراجعه شود.



سازمان تامين اجتماعي

بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد

انسداد در محل اتصال حالب به کلیه

UPJo





انسداد در محل اتصال حالب به مثانه

UVJo



نشریه شماره ۴۷

شماره تماس: ۲۳۶۰۱



۳- در صورتی که بیمار دردی در ناحیه شکم دارد که به شانه ها منتشر می شود می تواند با نوشیدن مایعات گرم و تغییر وضعیت بدن این درد را کاهش دهد .

۴- در صورتیکه بیمار درد غیرقابل تحمل و نفخ شدید شکم و عدم دفع مدفوع و یا عدم دفع گاز از ناحیه مقعد داشته باشد باید به پزشک اطلاع دهد .

۵- در صورتیکه بیمار ترشح از محل بخیه ها و محل درن داشته باشد باید به پزشک اطلاع دهد .

۶- در صورتی که بیمار تورم در محل عمل (شکم و پهلو ها) داشته باشد باید پزشک خود را در جریان بگذارد .

۷- گاهی پس از جراحی لاپاراسکوپی یا حین جراحی لاپاراسکوپی لازم است که بیمار به روش جراحی باز مجدداً مورد عمل جراحی قرار گیرد .